

## NOTICIARIO

SERRETA MEDIANA (*Mergus serrator*) 11 de Enero. Tres ejemplares se encontraban en aptitud de descanso en el interior de uno de los corrales de Rota (Punta Candor) donde encontraban un poco de calma frente al fuerte temporal que asolaba estas costas. Permanecieron allí toda la mañana.

Antonio Garrucho Reina y M<sup>a</sup> del Carmen Rivera Ramírez.

ARCHIBEBE PATIGUALDO CHICO (*Tringa flavipes*) 9 de Febrero (13:45h.). Un ejemplar de esta especie se encontraba en compañía de un grupo de archibebs comunes (*Tringa totanus*) en las marismas de Bonanza (Sanlúcar de Barrameda). Esta cita queda completamente confirmada gracias a la comparativa que pudimos hacer con los ejemplares de la otra especie. A destacar el amarillo vivo de sus patas y la mancha blanca del obispillo en vuelo, todo ello es de agradecer a la confianza que el ave mostró hacia nosotros.

Antonio Garrucho Reina y M<sup>a</sup> del Carmen Rivera Ramírez.

MALVASÍA CANELA (*Oxyura jamaicensis*) 29 de Marzo. Un individuo macho adulto en la laguna de Medina. Se encontraba en compañía de un grupo de malvasías comunes (*Oxyura leucocephala*) los cuales no parecían aceptarlo. En días posteriores no volvió a ser localizado. Tenemos conocimiento que el día 31 del mismo mes, es decir, dos días después, un ejemplar con las mismas características fue detectado en la laguna de Zoñar (Córdoba) y el equipo de la biológica de Doñana se encargó de abatirlo según el procedimiento establecido.

Antonio Garrucho Reina, M<sup>a</sup> del Carmen Rivera Ramírez y Pedro M. Delgado Diáñez.

GAVIOTA CABECINEGRA (*Larus melanocephalus*) 5 de Agosto (16:00h.). Un adulto en plumaje invernal merodeaba por la playa de Levante (Puerto de Santa María) esculcando muy cerca de los veraneantes, ante los cuales mostraba cierta confianza.

Antonio Garrucho Reina y M<sup>a</sup> del Carmen Rivera Ramírez.

### NOTA SOBRE ALGUNAS ESPECIES NUEVAS PARA LA FLORA GADITANA

Iñigo Sánchez García. Zoobotánico Jerez . c/ Taxdirt s/n .11404 JEREZ DE LA FRONTERA.  
isanchez@tiscalinet.es

En esta nota, continuación de las publicadas en los vol. I y II de esta revista, se relacionan 6 taxones que no habían sido citados previamente para la provincia de Cádiz. Sorprendentemente, y a diferencia de notas anteriores, todos ellos han sido registrados en una misma localidad, un pequeño pastizal en las instalaciones deportivas de Chapín, en pleno casco urbano de Jerez. Estas especies se localizaron en las primaveras de 2003 y 2004 y son recientes naturalizaciones como consecuencia de la celebración, en septiembre de 2002, de los Juegos Olímpicos Ecuestres en dichas instalaciones.

Ilustran como acontecimientos globales de corta duración (en este caso un par de semanas) pueden afectar a la flora de un territorio con la introducción involuntaria de especies exóticas, aunque es probable que varias de estas especies desaparezcan de la zona a medio plazo.

Además de las especies mencionadas se localizó a *Coriandrum sativum* (de la que sólo existía una cita previa en Cádiz, ver vol. II de esta revista) y cultivares de varias especies silvestres en la zona como *Avena bizantina*, *Medicago officinalis* o *Lens nigricans*.

*Malcolmia africana* ( L. )R. Br. in W.T. Aiton

Especie propia de terrenos incultos y bordes de cultivos propia del S de Europa y NE de Africa. En España se conoce de la mitad oriental, en Andalucía se había citado previamente en Granada, Almería y Jaén ( I. Nogueira en S. Castroviejo y otros (1993) *Flora Ibérica*, vol. IV: 84).

- Jerez, Chapín, 06.06.03, I. Sánchez

*Vicia villosa* Roth

La veza o arvejilla vellosa se cultiva como forraje y abono en verde y aparece como adventicia o naturalizada en el N y C de la Península ( C. Romero Zarco en S. Talavera y otros (1999) *Flora Ibérica*, vol. VII (I): 399). Es la primera ocasión que se cita en Andalucía.

- Jerez, Chapín, pastizales próximos al estadio municipal, 03.06.03, I. Sánchez

*Trifolium incarnatum* L. var. *incarnatum*

El trébol rojo también se utiliza como forrajera y se encuentra naturalizado en el Norte y Centro de la Península ( A. Muñoz, J.A. Devesa y S. Talavera en S. Talavera y otros (2000) *Flora Ibérica*, vol. VII (II): 664). Primera cita para Andalucía.

- Jerez, Chapín, pastizales próximos al estadio municipal, 28.05.03, I. Sánchez

*Trifolium vesseiculosum* Savi.

Esta especie de trébol, propia de pastizales en zonas próximas a zonas costeras del Mediterráneo, fue citada en el pasado muy localizada en Cataluña y Mallorca, pero no se había recolectado recientemente en la Península ( A. Muñoz, J.A. Devesa y S. Talavera en S. Talavera y otros (2000) *Flora Ibérica*, vol. VII (II): 699). No tenemos constancia de su uso como planta forrajera.

- Jerez, Chapín, pastizales próximos al estadio municipal, 22.05.03, I. Sánchez.

*Trifolium cernuum* Brot.

Este trébol es propio de herbazales del SW de Europa y NW de Africa, estando presente en pastizales del W de la Península Ibérica. En Andalucía se conocía en Córdoba, Granada y Sevilla ( A. Muñoz, J.A. Devesa y S. Talavera en S. Talavera y otros (2000) *Flora Ibérica*, vol. VII (II): 716).

- Jerez, Chapín, pastizales próximos al estadio municipal, 20.04.04, I. Sánchez.

*Oenothera speciosa* Nutt.

Especie del N de América que se ha naturalizado como ruderal y viaria en diversas partes del mundo. En la Península Ibérica sin embargo, sólo existía una única recolección a finales del S. XIX en Játiva, Valencia ( W. Dietrich en S. Castroviejo y otros (1997) *Flora Ibérica*, vol. VIII: 100).

- Jerez, Chapín, pastizales próximos al estadio municipal, 22.05.03, I. Sánchez.

### CITAS INTERESANTES:

Cadáver de garduña (*Martes Foina*) encontrado e identificado por David Ríos el día 11 de septiembre de 2003, en la carretera Castellar-Jimena, en el Km. 101 (comarcal 3331). No sabemos si habrá otras citas para el Campo de Gibraltar. Por favor comunicadlas si tenéis alguna.

Coordenadas UTM

4019840 N; 30 283281 E

Avión roquero (*Ptyonoprogne rupestris*) completamente albino, detectado por Hamo Sassón y Martín Jacobi por la tarde del día 8 de octubre de 2003, volando con otros individuos de su misma especie de aspecto normal en torno a la torre circular del castillo de Jimena de la Frontera.



Foto: Martín Jacobi

Un halcón de Eleonora (*Falco eleonora*) herido por disparo en un ala, es entregado al Seprona el día 10 de octubre de 2003. Según el alumno que me lo entregó, el animal fue encontrado en el paraje denominado Cerro del Galgo, en el límite N. de la población gaditana de San Martín del Tesorillo.

Enrique Emberly Moreno