

# RAMARIA SUBBOTRYTIS (COKER) CORNER., UN NUEVO TAXÓN DEL GÉNERO RAMARIA PARA ANDALUCÍA

Manuel Becerra Parra\*, Estrella Robles Domínguez

*Micogest. Gestión, Educación y Turismo Ambiental. Colonia Monte Algaida calle LL 15, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).*

Recibido: 18 de agosto de 2011. Aceptado (versión revisada): 26 de octubre de 2011. Publicado en línea: 3 de mayo de 2012

**Palabras claves:** *Ramaria*, Gomphales, corología, Andalucía, Cádiz, Parque Natural Los Alcornocales.

**Keywords:** *Ramaria*, Gomphales, chorology, Andalusia, Cádiz, Los Alcornocales Natural Park.

Durante el otoño de 2010 prospectamos diversas zonas del Parque Natural Los Alcornocales con la intención de aumentar el catálogo micológico de la provincia de Cádiz, una aproximación del cual ya habíamos publicado anteriormente con un total de 1.030 Taxones diferentes (Becerra y Robles 2009).

Durante una de estas salidas recolectamos una especie del género *Ramaria* que no había sido observada durante nuestras excursiones por Los Alcornocales y que tras consultar la bibliografía de la que disponíamos identificamos como *Ramaria subbotrytis* (Coker) Corner (Fig. 1).

El material fue remitido a un especialista en este género que nos confirmó la correcta identificación de nuestra colecta. Tras buscar citas previas de este taxón para la provincia de Cádiz y Andalucía comprobamos que no se encontraba citado para nuestra comunidad autónoma (Moreno-Arroyo et al. 2004; Sogorb 2007) (Figs. 2, 3).

Este taxón se caracteriza por su carpóforo de un color rojo-rosado a rosa-salmón, sus hifas no fibuladas y sus esporas cilíndricas (Pérez Daniëls 2007).

Los datos de nuestra colecta son los siguientes:

*Ramaria subbotrytis* (Coker) Corner

CÁDIZ. Jerez de la Frontera, carretera del mojón de la Víbora al puerto de Gáliz, proximidades de la venta de Lleja. 30S TF75. En bosque de *Quercus suber*, sobre suelo, 640 m. Leg. M. Becerra. 04/12/2010. El material se encuentra depositado en el herbario JA-cusst, aunque por causas ajenas a nosotros aún no disponemos de número de registro.

## Agradecimientos

A Pablo Pérez Daniëls por confirmarnos la correcta identificación de esta especie.

## Bibliografía

Becerra Parra M, Robles Domínguez E. 2009. Las setas de la provincia de Cádiz. 100 especies para conocer su riqueza micológica. Editorial La Serranía. Ronda.



Fig. 1. *Ramaria subbotrytis* (Foto: M. Becerra).




Fig. 2. Mapa de distribución de *Ramaria subbotrytis* en la Península Ibérica.

Moreno Arroyo B (coord). 2004. Inventario Micológico Básico de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Córdoba.

Pérez Daniëls P, Tellería MT. 2007. Notas sobre el orden Gomphales (III): taxones de Castilla y León. *Boletín Micológico de FAMCAL* 2: 23-38.

Sogorb Castro JR. 2007. Hongos del Parque Natural Los Alcornocales y Campo de Gibraltar. Algeciras.




Fig.3. Distribución en Andalucía de *Ramaria subbotrytis*.